

# Sorolina®

INJETÁVEL  
USO VETERINÁRIO



## FÓRMULA:

### Cada 100 mL contém:

Cloridrato de adrenalina.....0,1 g  
Veículo q.s.p.....100 mL

## PROPRIEDADES:

**Sorolina®** tem em sua composição a adrenalina que excita seletivamente as terminações simpáticas, provocando uma vasoconstrição de arteríolas, artérias, veias e vênulas, o que o torna um agente hipertensor e hemostático.

É estimulante cardiovascular, aumenta a pressão sanguínea, acelera o coração, aumenta a resistência dos vasos capilares diminuindo a sua permeabilidade. Inibe a musculatura lisa do estômago e intestino. Provoca um aumento da transpiração e das secreções, substituindo deste modo a sangria dos animais.

## INDICAÇÕES:

Tratamento de Laminite (aguamento), inflamações na parte inferior das patas (arejamento), cólica dos cavalos, burros, mulas e jumentos, substituindo com vantagens a sangria destes animais.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Deve ser aplicado exclusivamente por VIA INTRAMUSCULAR PROFUNDA.

**Animais adultos:** 1 ampola de 10 mL.

**Animais novos:** a dose varia de acordo com a idade e peso do animal, não ultrapassando o volume de 10 mL.

## OBSERVAÇÃO:

Antes da aplicação deve-se proceder a assepsia do local com álcool iodado, devendo-se usar seringa e agulha previamente esterilizadas. A aplicação quando bem feita não apresenta reações indesejáveis.

As indicações, posologia e modo de usar poderão ser modificadas a critério do Médico Veterinário.

## ADVERTÊNCIAS:

- O produto não deve ser utilizado em animais com hipersensibilidade ao cloridrato de adrenalina.
- Animais com distúrbios cardiovasculares ou suspeita de distúrbios cardiovasculares devem ser avaliados por um médico veterinário antes da administração do produto.
- Dependendo da susceptibilidade do animal, alguns efeitos adversos podem ocorrer, como dispneia, taquicardia, tremores, arritmias cardíacas e aumento agudo da pressão sanguínea que pode levar à hemorragia cerebral.
- O uso de adrenalina ou de outro simpatomimético deve ser evitado na gestação, pois seus efeitos vasoconstritores podem reduzir a perfusão placentária. Outro efeito adverso com o uso da adrenalina ou de outro medicamento beta-2 agonista é a inibição do parto.

## APRESENTAÇÃO:

Caixa contendo 2 ampolas com 10 mL.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Manter a embalagem fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 208 em 24/09/70

Resp. Téc. Méd. Vet.:  
Dra. Thaís Marino Silva Giro  
CRMV/SP 17.469



PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:  
**UZINAS QUÍMICAS BRASILEIRAS S.A.**  
Praça Dr. Joaquim Batista, 150 - Jaboicabal - SP  
**Central de Relacionamento: 0800-160024**  
CNPJ.: 50.380.674/0001-37 - Indústria Brasileira  
Visite nosso site: [www.ucbveter.com.br](http://www.ucbveter.com.br)