

Fórmula: Cada 100 mL contém: Cloridrato de Adrenalina 0,1 g; Veículo Conservante e Estabilizante q.s.p. 100 mL.

Propriedades: Sorolina® tem em sua composição a adrenalina, substância que excita seletivamente as terminações simpáticas, provocando uma vasoconstrição de arteríolas, artérias, veias e vênulas, o que o torna um agente hipertensor e hemostático. É estimulante cardiovascular, aumenta a pressão sanguínea, acelera o coração, aumenta a resistência dos vasos capilares, diminuindo a sua permeabilidade. Inibe a musculatura lisa do estômago e intestino. Provoca um aumento da transpiração e das secreções, substituindo deste modo a sangria dos animais.

Indicações: Tratamento de Laminite (aguamento), inflamações na parte inferior das patas (arejamento), cólica dos cavalos, burros, mulas e jumentos, substituindo com vantagens a sangria destes animais. **Posologia e Modo de Usar:** Deve ser aplicado exclusivamente por VIA INTRAMUSCULAR PROFUNDA. Animais Adultos: 1 ampola de 10 mL. Animais Novos: a dose varia de acordo com a idade e peso do animal, não ultrapassando o volume de 10 mL.

Observação: Antes da aplicação deve-se proceder a assepsia do local com álcool iodado, devendo-se usar seringa e agulha previamente esterilizadas. A aplicação quando bem feita não apresenta reações indesejáveis. As indicações, posologia e modo de usar poderão ser modificadas a critério do Médico Veterinário.

Advertências: O produto não deve ser utilizado em animais com hipersensibilidade ao cloridrato de adrenalina. Animais com distúrbios

cardiovasculares ou suspeita de distúrbios cardiovasculares devem ser avaliados por um médico veterinário antes da administração do produto. Dependendo da susceptibilidade do animal, alguns efeitos adversos podem ocorrer, como dispneia, taquicardia, tremores, arritmias cardíacas e aumento agudo da pressão sanguínea que pode levar a hemorragia cerebral. O uso da adrenalina ou de outro simpatomimético deve ser evitado na gestação, pois seus efeitos vasoconstritores podem reduzir a perfusão placentária. Outro efeito adverso com o uso da adrenalina ou de outro medicamento beta-2 agonista é a inibição do parto. **Apresentações:** Caixa contendo 2 ampolas com 10 mL Encartelado contendo 2 ampolas com 10 mL **Venda sob prescrição do Médico Veterinário.** Manter a embalagem fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Licenciado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento desde 24/09/1970 Registrado sob o número SP 000217-8.000011. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469 Proprietário e Fabricante: Usinas Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboatão – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira - Consulte sempre o médico veterinário.

SAC 0800-1600024

ucbvet.com

