

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Revisão	01	31/08/2021
Nome do produto	CORTVET	
Classe terapêutica	Anti-inflamatório esteroideal	
Princípio Ativo	Dexametasona	
Forma farmacêutica	Solução estéril injetável	
Apresentação	Frasco-ampola com 10 mL. Frasco-ampola com 50 mL. Frasco-ampola com 100 mL.	
Fórmula	Cada 1 mL contém: Dexametasona (fosfato dissódico) ..... 2 mg Veículo q.s.p. .... 1 mL	
Propriedades	<b>Cortvet</b> é composto por um análogo sintético da prednisolona, porém com atividade anti-inflamatória mais potente e com efeitos hormonais melhorados. A dexametasona possui um efeito anti-inflamatório maior que os outros corticosteroides.	
Indicações de uso	<b>Cortvet</b> é indicado para bovinos, equinos e suínos em todos os casos que se faça necessária uma resposta hormonal imediata. <b>Grandes animais:</b> como auxiliar nos casos de mastites agudas, metrites, pneumonias graves, febre dos transportes e vitular e cetose em bovinos. Nos equinos está indicado para casos de afecções do sistema musculo esquelético como: miosite, carpíte, bursite, luxações e como medicação auxiliar na fadiga e exaustão devido ao calor.	
Espécies indicadas	Bovinos, Equinos e Suínos	
Via de administração	Injetável - Intramuscular ou intravenosa (a via intravenosa só deve ser utilizada em casos de estado de choque, toxemia e crise circulatória)	
Posologia e Modo de Usar	A via intravenosa só deve ser utilizada em casos de estado de choque, toxemia e crise circulatória. <b>Bovinos:</b> 2,5 a 10 mL por via intramuscular ou intravenosa de acordo com a gravidade do caso. <b>Equinos:</b> 1,25 a 2,5 mL por via intramuscular ou intravenosa. <b>Suínos:</b> 0,5 a 3 mL por via intramuscular ou intravenosa.	
Recomendações e Precauções	Deve-se ter em mente que todo corticosteroide tem profundos efeitos metabólicos e seus efeitos adversos como a retenção do sódio e líquidos, perda de potássio, ganho de peso e depressão da função do córtex da adrenal deve ser levada em conta, principalmente quando se institui uma terapia com altas doses e por tempo prolongado. Não interromper a terapia abruptamente, instituir um esquema regressivo de dosagens. Só utilizar <b>Cortvet</b> em casos de infecções crônicas e agudas concomitantemente com um agente antimicrobiano eficaz. Os corticosteroides quando administrados em fêmeas no terço final da gestação podem induzir o parto. Quando aplicado em equinos em dose superior a 5 mg pode surgir sintomas de sonolência e letargia que desaparecerão após 24 horas.	
Período de carência	<p><b>ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA</b></p> <p><b>BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO PELA VIA INTRAMUSCULAR.</b></p> <p><b>ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 13 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO PELA VIA INTRAVENOSA.</b></p> <p><b>LEITE: O LEITE DE ANIMAIS TRATADOS POR VIA INTRAMUSCULAR OU PELA VIA INTRAVENOSA COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 73 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.</b></p> <p><b>SUÍNO: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.</b></p>	

	<b>A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO</b>
<b>Validade</b>	24 meses a partir da data de fabricação
<b>Validade após abertura do frasco</b>	28 dias
<b>Conservação</b>	Manter a embalagem fechada em local fresco e seco ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
<b>Registro MAPA e data de emissão</b>	4.816/94 em 31/08/1994.
<b>Razão Social e CNPJ do Proprietário</b>	Uzinas Químicas Brasileiras S.A. 50.380.674/0001-37
<b>Razão Social e CNPJ do Fabricante</b>	Uzinas Químicas Brasileiras S.A. 50.380.674/0001-37