



# Mastizone

## Cefoperazona Sódica



Intramamário  
USO VETERINÁRIO

Bovinos

### FÓRMULA:

Cada seringa de 10 g contém: Cefoperazone sódico 250 mg  
Veículo q.s.p. 10 g

### PROPRIEDADES:

**Mastizone** é elaborado com cefoperazone sódico, um antibiótico pertencente à família das cefalosporinas de terceira geração, possuindo ação bactericida sobre uma ampla variedade de germes Gram-negativos e Gram-positivos, aeróbicos e anaeróbicos, causadores de mastite. Sendo uma cefalosporina de terceira geração, possui uma atividade antibacteriana “in vitro” e uma maior resistência à enzima beta-lactamase, produzidas pela maioria dos germes patógenos Gram-negativos, que as cefalosporinas de primeira e segunda gerações.

### INDICAÇÕES:

Mastites clínicas causadas por bactérias sensíveis ao cefoperazone sódico, tais como: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus pyogenes*, *Micrococcus* spp, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* (inclusive produtores de penicilinase), *Staphylococcus epidermidis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Corynebacterium pyogenes*, *Corynebacterium bovis* e *Klebsiella* spp.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Após esgotar o leite, lavar o teto com água e sabão, e enxugá-lo com toalha limpa. Injetar o conteúdo de uma seringa em cada teto infeccionado e massagear suavemente o teto tratado, de baixo para cima, para que o medicamento alcance regiões mais altas. **Mastizone** mantém seu efeito terapêutico por um período de 48 horas, sendo suficiente uma única aplicação para a cura na maioria dos casos. Alterações na posologia à critério do Médico Veterinário.

## APRESENTAÇÕES:

Caixa contendo 12 seringas descartáveis com 10 g

Caixa contendo 24 seringas descartáveis com 10 g

Balde contendo 48 seringas descartáveis com 10 g.

## PERÍODOS DE CARÊNCIA

### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Manter a embalagem fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 5.439/96 em 12/02/1996 Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469 Proprietário: Uzinac Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira Fabricante: Vansil Ind. Com. e Representações LTDA Rua João Augusto Cirelli, 640 Descalvado – SP CNPJ: 50.472.547/0001-68 – Indústria Brasileira