

Colentim

Cloreto de carbamilcolina



Injetável
USO VETERINÁRIO

Equinos

FÓRMULA:

Cada 5mL contém: Cloreto de carbamilcolina 5 mg Veículo q.s.p. 5 mL

PROPRIEDADES:

O cloreto de carbamilcolina produz no organismo uma excitação semelhante à produzida pelo sistema nervoso parassimpático, estimulando tanto a secreção glandular como o peristaltismo gastrointestinal.

INDICAÇÕES:

Colentim é indicado no tratamento das cólicas dos equídeos, empazinamento, timpanismo e obstrução faríngea.

POSOLOGIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

Equídeos 2 a 4 mL

Potros 0,5 a 2 mL

Colentim deve ser aplicado somente por via subcutânea, fazendo sempre a assepsia local com álcool ou álcool iodado.

ATENÇÃO: tendo em vista a propensão que as grandes dosagens poderão causar intoxicações, recomenda-se aplicar a dose indicada fracionada em pequenas doses repetidas em intervalos de 30 a 60 minutos. Nos transtornos do aparelho digestivo, recomendamos o uso de catárticos ou salinos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicar esse produto em fêmeas em gestação, pois pode ocasionar aborto, e nem em animais muito velhos ou muito fracos e caquéticos, e nem em animais que se apresentem com distúrbios cardiovasculares ou respiratórios.

NOTA: quando se é necessário neutralizar a ação de **Colentim** deve-se aplicar solução de atropina a 1% na dose de 3 a 5 mL.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 20 frascos-ampolas de 5 mL.

Caixa com 30 frascos-ampolas de 5 mL.

Manter a embalagem fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.



Licenciado pelo MAPA desde 28/08/1967, Registrado sob o nº SP 000217-8.000015

Responsável Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Giro
– CRMV/SP 17.469

Proprietário e Fabricante:

Uzinas Químicas Brasileiras S/A

Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP

CEP: 14870-090

CNPJ: 50.380.674/0001-37

Indústria Brasileira