

**EQUIFLAN**
— Firocoxibe —Oral
USO VETERINÁRIO

Equinos

FÓRMULA:

Cada 100 g contém: Firocoxibe 1,00 g Veículo q.s.p. 100,00 g

INFORMAÇÕES GERAIS:

EQUIFLAN é composto por firocoxibe, um anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) com atividade inibidora seletiva da ciclooxigenase-2 (COX-2). O bloqueio preferencial de COX-2 inibe a produção das prostaglandinas pró-inflamatórias relacionadas com o desenvolvimento da dor e da inflamação, poupando, assim, as prostaglandinas citoprotetoras, sintetizadas pela COX-1, que mantêm as funções gastrointestinais, plaquetárias e renais normais. Possui propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Além disso, após administração oral, a biodisponibilidade é de aproximadamente 79%, alcançando concentração plasmática máxima entre 4 e 12 horas após o tratamento. Possui alta capacidade de distribuição corpórea mesmo com a elevada taxa de ligação às proteínas plasmáticas (98%). A biotransformação ocorre, principalmente, por meio de desalquilação e glucoronidação no fígado, sendo a maior parte do firocoxibe excretado na urina na forma inativa de desciclopropilmetilfirocoxib conjugado com glucoronídeo. A meia-vida de eliminação é de aproximadamente 30-40 horas.

INDICAÇÕES:

EQUIFLAN é indicado no tratamento de processos inflamatórios de equinos, principalmente, quando associados aos tecidos moles ou musculoesqueléticos. Além disso, também possui ação antipirética, sendo eficaz no controle do processo febril. *A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.*

POSOLOGIA:

Administrar **EQUIFLAN** por via oral na dose de 0,1 mg/kg, equivalente a 1 g do produto para cada 100 kg de peso vivo a cada 24 horas durante 7 dias consecutivos.

A seringa graduada permite dosificar a quantidade de produto a ser administrada ao animal. Cada demarcação no êmbolo da seringa equivale a 50 kg de peso vivo e cada demarcação intermediária aos valores descritos correspondem a um incremento de peso de 25 kg. Para administrar a dose correta, arredondar o peso vivo do animal até o incremento de 25 kg mais próximo. Uma seringa é suficiente para tratar um animal de até 700 kg de peso vivo.

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO:

EQUIFLAN deve ser aplicado exclusivamente pela via oral de acordo com as seguintes recomendações:

- 1 – Observar as demarcações existentes no êmbolo da seringa;
- 2 – Girar o anel presente no êmbolo até a marca do peso vivo do animal a ser tratado.
- 3 – Introduzir a seringa no espaço interdental e pressionar o êmbolo até o anel travar o movimento do mesmo, depositando a pasta em cima da língua em direção ao fundo da boca.
- 4 – Após a aplicação, levantar a cabeça do animal por alguns segundos a fim de se garantir a adequada ingestão do produto.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO :

- Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade ao firocoxibe.
- Não utilizar o produto fora das indicações da bula.
- Não utilizar o produto em outras espécies de animais.
- Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos, hipotensos ou em terapia diurética concomitante, devido ao risco de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Utilizar com cautela em animais com disfunções renais, hepáticas ou cardiovasculares, devendo o tratamento ser monitorado por um Médico Veterinário.
- Este medicamento não foi testado quanto a sua segurança em fêmeas prenhes, fêmeas em lactação e equinos com idade inferior a 24 meses.

PRECAUÇÕES:

- Obedecer à dosagem, via de administração (oral) e demais recomendações indicadas para o uso do produto.
- Realizar a pesagem dos animais antes do tratamento para definição da dose adequada.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não armazenar o medicamento junto a alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza.

- Lavar as mãos após a manipulação do produto.

REAÇÕES ADVERSAS:

Nos estudos clínicos conduzidos com o **EQUIFLAN**, não foram observadas reações locais ou sistêmicas. Portanto, não são esperadas reações adversas com o uso do produto, quando administrado conforme as instruções e indicações previstas nesta bula.

Segundo a literatura, podem ocorrer episódios de diarreia que tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento. A administração de doses elevadas pode resultar em ataxia, excitação, aparecimento de lesões orais e ulcerações gástricas, sendo de suma importância, portanto, o respeito à dosagem indicada. Em caso de intoxicação, recomenda-se o tratamento sintomático e a suspensão imediata da terapia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não administrar **EQUIFLAN** simultaneamente a:

- Outros AINEs (anti-inflamatórios não-esteroidais) e corticosteróides devido ao aumento do risco de desenvolvimento de toxicidade gastrointestinal (ulcerações, sangramentos, diarreia, cólicas, etc.)
- Drogas nefrotóxicas (p.ex. furosemida, aminoglicosídeos, anfotericina B, etc.), uma vez que podem aumentar o risco de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Anticoagulantes (p.ex. warfarina, heparina e ácido acetilsalicílico) pelo aumento da possibilidade de sangramentos.

APRESENTAÇÕES:

Seringa descartável contendo 7,32 g.

PRAZO DE VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

EQUINOS:

"ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO".

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO



Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 79/2021 em 15/07/2024.
Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thais Marino Silva Girio
CRMV/SP 17.469

Proprietário e Fabricante:

Uzinas Químicas Brasileiras S/A
Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboaticabal – SP
CEP: 14870-090
CNPJ: 50.380.674/0001-37
Indústria Brasileira