

Falexyl

Cefalexina monohidratada

Oral
USO VETERINÁRIO



FÓRMULA:

FALEXYL	75 mg	300 mg	600 mg
Cada comprimido contém:			
Cefalexina (monohidratada)	75 mg	300 mg	600 mg
Excipiente q.s.p.	200 mg	800 mg	1600 mg

INFORMAÇÕES GERAIS

FALEXYL é um antibiótico pertencente à família das cefalosporinas. Apresenta ação bactericida pela inibição da síntese da parede bacteriana devido à inativação da transpeptidase e consequente destruição e morte da bactéria responsável pelo processo infeccioso.

INDICAÇÕES E ESPÉCIES

FALEXYL é um comprimido palatável indicado para cães no tratamento de infecções causadas por micro-organismos sensíveis à cefalexina, tais como: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius* e *Streptococcus pyogenes*.

POSOLOGIA E FORMA DE APLICAÇÃO

Administrar **FALEXYL** por via oral na dose de 30mg/kg de peso corpóreo a cada 12 horas, durante 7 dias. Estudo de segurança realizado em cães saudáveis em que o **FALEXYL** foi administrado na dose de 30 mg/kg a cada 12 horas por 30 dias, mostrou que o **FALEXYL** foi bem tolerado, não sendo observados efeitos colaterais nos animais estudados. A segurança do produto não foi avaliada em animais jovens, e em animais em reprodução, gestação e lactação.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade às cefalosporinas.
- Utilizar com precaução em animais alérgicos a outros antibióticos beta-lactâmicos (penicilinas, cefamicinas e carbapenems).
- Não administrar cefalexina oral em animais septicêmicos, em choque ou que apresentem outras doenças graves, uma vez que a absorção do medicamento no trato gastrointestinal pode ser retardada ou diminuída significativamente.
- O tratamento em animais com insuficiência renal deve ser acompanhado por Médico Veterinário.
- Não utilizar este medicamento com prazo de validade vencido.

PRECAUÇÕES:

- Realizar a pesagem dos animais antes do tratamento.
- Não guardar o produto junto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.

EFEITOS COLATERAIS:

Transtornos gastrointestinais, como vômitos, náuseas e diarreia, são geralmente pouco frequentes com a administração oral de Cefalexina, mas podem ser minimizados com a sua administração junto a uma pequena quantidade de alimento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A associação com probenecida pode aumentar os níveis séricos e a meia vida da cefalexina por retardar a sua excreção renal. Além disso, a administração simultânea com antibióticos aminoglicosídeos ou com diuréticos de alça (p.ex. furosemda) pode potencializar os efeitos nefrotóxicos das cefalosporinas.

APRESENTAÇÕES

- Cartucho contendo 1 blíster com 7 comprimidos com 75mg ou 300mg;
- Cartucho contendo 1 blíster com 14 comprimidos com 75mg ou 300mg;
- Cartucho contendo 2 blísteres com 7 comprimidos cada com 600mg;
- Cartucho contendo 1 blíster com 7 comprimidos com 600mg;
- Display contendo 5 blísteres de 14 comprimidos cada com 75mg ou 300mg
- Display contendo 10 blísteres de 7 comprimidos cada com 600mg;

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000217-8.000001 em 09/10/2020. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469

Proprietário: Usinas Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira
Fabricante: Vansil Ind. Com. E Representações LTDA Rua João Augusto Cirelli, 640 Descalvado – SP CNPJ: 50.472.547/001-68 Indústria Brasileira