

Ivermectan

Ivermectina Injetável a 1%



Injetável
USO VETERINÁRIO

Bovinos

FÓRMULA

Cada 100 mL contém: Ivermectina 1 g Veículo.q.s.p 100 mL

INDICAÇÃO

Ivermectan injetável a 1% é indicado no tratamento e controle de vermes redondos pulmonares e gastrintestinais, carrapatos, piolhos, bernes e sarnas de bovinos. Auxilia no controle da mosca-do-chifre e previne miases (bicheiras) no umbigo de bezerros recém-nascidos e nas feridas de castração.

Pode ser usado em vacas prenhes e reprodutores.

Parasitas combatidos por Ivermectan injetável a 1%:

<p>Vermes redondos gastrintestinais <i>Ostertagia</i> spp (inclusive formas L4 ou hipobrióticas) <i>Haemonchus</i> spp <i>Trichostrongylus</i> spp <i>Cooperia</i> spp <i>Bunostomum</i> spp <i>Oesophagostomum</i> spp <i>Nematodirus</i> spp <i>Strongylodes</i> spp</p>	<p><i>Trichuris</i> spp Vermes pulmonares <i>Dictyoкауtus</i> spp Carrapatos: <i>Rhipicephalus (B.) microplus</i> Miases (bicheiras): (preventivo) <i>Hypoderma</i> bovis</p>	<p>Bernes: <i>Dematobia hominis</i> Piolhos sugadores: <i>Linxognathus</i> spp <i>Haematoporus</i> spp <i>Solenopte</i> sp Piolhos mastigadores: <i>Damaenia</i> spp Ácaros da sarna: <i>Psoroptes</i> sp <i>Sarcoptes</i> sp <i>Chorioptes</i> sp Mosca-do-chifre: <i>Haematobia irritans</i></p>
---	---	---

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Aplicar por via subcutânea.

A dosagem recomendada para bovinos é de 1 mL de **Ivermectan injetável a 1%** para cada 50 kg de peso corpóreo.

Tabela para Bovinos:

Peso (kg)	Dose (mL)	Peso (kg)	Dose (mL)
até 50 kg	1 mL	de 301 a 350	7 mL
de 51 a 100	2 mL	de 351 a 400	8 mL
de 101 a 150	3 mL	de 401 a 450	9 mL
de 151 a 200	4 mL	de 451 a 500	10 mL
de 201 a 250	5 mL	de 501 a 550	11 mL
de 251 a 300	6 mL	de 551 a 600	12 mL

Animais com mais de 600 kg, manter a mesma dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corpóreo.

Nos bezerros recém-nascidos administrar 1 mL por animal (via subcutânea) visando a prevenção do desenvolvimento de bicheiras, evitando a instalação da onfalofebite por contaminações diversas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO "28" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

"A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO."

APRESENTAÇÕES

Frascos de 50, 200, 500 mL ou 1 L

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e animais domésticos.

"Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de terminação."

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.



Licenciado pelo MAPA desde 22/02/2000, Registrado sob o nº SP 000217-8.
000032.

Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469

Proprietário e fabricante: Uzinás Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista,
150 - Jaboicabal - SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira