

Nausetrat Injetável

Cloridrato de metoclopramida

Antiemético
USO VETERINÁRIO



Cães

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém: Cloridrato de metoclopramida 500 mg Veículo q.s.p.100 mL

INDICAÇÃO:

NAUSETRAT Injetável é indicado para cães no controle de episódios eméticos, indicativo de náuseas e distúrbios digestivos.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Administrar por via intramuscular.

A dose recomendada para cães é de 0,1 mL de **NAUSETRAT Injetável** (equivalentes a 0,5 mg de metoclopramida) por kg de peso corpóreo. A duração do tratamento deverá ser a critério do médico veterinário. Alterações na dosagem e modo de usar poderão ser feitas a critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

A metoclopramida é contraindicada em animais com antecedentes de hipersensibilidade à droga. Não aplicar em animais com obstrução ou perfuração gastrointestinal. Não aplicar em animais com epilepsia ou que usem neurolépticos. Não administrar junto com analgésicos narcóticos tranquilizantes, pois pode haver potencialização dos efeitos sedativos. A metoclopramida pode aumentar os efeitos séricos da prolactina sendo contraindicado em animais com neoplasias mamárias. Drogas anticolinérgicas como a atropina bloqueiam a ação da metoclopramida. Evitar o uso do produto em animais prenhes ou em casos de envenenamento.

EFEITOS COLATERAIS:

Os efeitos colaterais incluem nervosismo, inquietação, cansaço e depressão. Distúrbios no trato gastrointestinal também podem ser observados.

PRECAUÇÕES:

O produto deve ser mantido em sua embalagem original. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 4 meses. A superdosagem pode provocar sinais do tipo extrapiramidal, sedação, ataxia, agitação, náuseas, vômito e constipação. Em pacientes com feocromocitoma, a metoclopramida pode induzir a uma crise hipertensiva.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não administrar a metoclopramida junto com tranquilizantes, podendo ocorrer potencialização dos efeitos sedativos. Não administrar a metoclopramida junto com analgésico opióceio, podendo antagonizar os efeitos da metoclopramida sobre a motilidade gastrintestinal. Drogas colinérgicas podem aumentar os efeitos gastrintestinais da metoclopramida. A metoclopramida pode aumentar o risco de toxicidade se administrado junto com a ciclosporina. Não administrar a metoclopramina junto com inibidores da MAO, pois podem causar hipertensão. A metoclopramida pode aumentar a absorção gastrintestinal quando administrada com produtos à base de tetraciclina.

APRESENTAÇÕES:

Caixa contendo 1 frasco-ampola com 10 mL

PRAZO DE VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação.

Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário



Licenciado pelo MAPA desde 29/10/2001, Registrado sob o nº SP 000217-8.000019. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio - CRMV/SP 17.469. Proprietário e Fabricante: Usinas Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 - Jaboaticabal - SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37. Indústria Brasileira.