

Nausetrat Solução Oral

Cloridrato de metoclopramida

Antiemético
USO VETERINÁRIO



Cães

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém: Cloridrato de metoclopramida 500 mg Veículo q.s.p. 100 mL

INFORMAÇÕES GERAIS:

A metoclopramida é um antiemético de ação tanto central como periférica. A ação central resulta do bloqueio dos receptores dopaminérgicos na zona quimiorreceptora disparadora. A ação periférica resulta da estimulação da motilidade gástrica e do duodeno através do aumento de sensibilidade da musculatura lisa à acetilcolina (ACh). A motilidade impede a atonia gástrica necessária para o vômito. **Farmacocinética:** A absorção da metoclopramida pelo trato intestinal é rápida. Os níveis plasmáticos máximos são alcançados em 2 horas. O metabolismo de primeira passagem resulta em biodisponibilidade de 50-70%. A metoclopramida é amplamente distribuída nos tecidos, incluindo os do Sistema Nervoso Central (SNC). A eliminação da metoclopramida é realizada pela via renal, sendo 25% na forma inalterada e 75% dos metabólitos conjugados. A meia vida plasmática no cão tem sido relatada como de aproximadamente 90 minutos. **Farmacodinâmica:** A metoclopramida estimula a motilidade muscular lisa do trato gastrointestinal superior, sem estimular as secreções gástricas, biliar e pancreática. Seu mecanismo de ação é desconhecido, parecendo sensibilizar os tecidos para a atividade da ACh. O efeito da metoclopramida na motilidade não é dependente da inervação vagal intacta, porém, pode ser abolido pelas drogas anticolinérgicas. A metoclopramida aumenta o tônus e amplitude das contrações gástricas (especialmente antral), relaxa o esfíncter pilórico, duodeno e jejuno, resultando no esvaziamento gástrico e trânsitos intestinais acelerados. Aumenta o tônus de repouso do esfíncter esofágico inferior.

INDICAÇÕES E ESPÉCIES:

NAUSETRAT Solução Oral é indicado para cães no controle de episódios eméticos (vômito), indicativo de náuseas e distúrbios digestivos.

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:

Administrar por via oral. A dose recomendada para cães é de 1 a 4 gotas/kg de peso corpóreo, que corresponde a 0,1 mg a 0,4 mg de metoclopramida por kg de peso corpóreo. A duração do tratamento deverá ser a critério do médico veterinário. Alterações na dosagem e modo de usar poderão ser feitas à critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

A metoclopramida é contraindicada em animais com antecedentes de hipersensibilidade à droga. Não aplicar em animais com obstrução ou perfuração gastrointestinal. Não aplicar em animais com epilepsia ou que usem neurolépticos. Não administrar junto com analgésicos narcóticos tranquilizantes, pois pode haver potencialização dos efeitos sedativos. A metoclopramida pode aumentar os efeitos séricos da prolactina sendo contraindicado em animais com neoplasias mamárias. Drogas anticolinérgicas como a atropina bloqueiam a ação da metoclopramida. Evitar o uso do produto em animais prenhes ou em casos de envenenamento.

EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES:

Os efeitos colaterais incluem nervosismo, inquietação, cansaço e depressão. Distúrbios no trato gastrointestinal também podem ser observados. O produto deve ser mantido em sua embalagem original. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 2 meses, desde que conservado em local com temperatura e umidade adequados e fechado corretamente. A superdosagem pode provocar sinais do tipo extrapiramidal, sedação, ataxia, agitação, náuseas, vômito e constipação. Em pacientes com feocromocitoma, a metoclopramida pode induzir uma crise hipertensiva.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não administrar a metoclopramida junto com tranquilizantes, podendo ocorrer potencialização dos efeitos sedativos. Não administrar a metoclopramida junto com analgésico opiáceo, podendo antagonizar os efeitos da metoclopramida sobre a motilidade gastrointestinal. Drogas colinérgicas podem aumentar os efeitos gastrointestinais da metoclopramida. A metoclopramida pode aumentar o risco de toxicidade se administrado junto com a ciclosporina. Não administrar a metoclopramina junto com inibidores da MAO, pois podem causar hipertensão. A metoclopramida pode aumentar a absorção gastrointestinal quando administrada com produtos à base de tetraciclina.

APRESENTAÇÕES:

Frasco conta-gotas com 20 mL

PRAZO DE VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação.

Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 7.982/2001 em 23/10/2001 Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thais Marino Silva Gírio – CRMV/SP 17.469 Proprietário e Fabricante: Uzinas Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira