

Ocitocina Forte UCB

Ocitocina

USO VETERINÁRIO

Injetável



Bovinos, Equinos, Suínos, Caprinos e Ovinos

FÓRMULA:

Cada 1 mL contém: Ocitocina Sintética 10 UI, Veículo q.s.p. 1 mL

PROPRIEDADES:

A **Ocitocina Forte UCB** tem ação seletiva sobre a musculatura lisa do útero e das glândulas mamárias, promovendo um aumento das contrações musculares do útero no momento do parto, ajudando a expulsão da cria e da placenta e controlando a hemorragia.

A ocitocina sintética tem a particularidade de estimular o útero somente quando este se apresentar em estado de prenhez, ou em algum estado patológico (metrite), e sua atividade será restrita até 4 semanas antes do parto, durante e após o parto.

A ação da ocitocina sobre as glândulas mamárias se faz através de um aumento das contrações musculares dos alvéolos e dos canais galactóforos, impulsionando o leite contido nos alvéolos para os canais e destes para a cisterna, aumentando o fluxo de leite e promovendo o esgotamento total da glândula mamária.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR:

1—Insuficiência contrátil primária ou secundária da musculatura uterina durante o parto.

Aplicar por via subcutânea se não houver contrações suficientes; após 20 minutos recomenda-se proceder a uma nova aplicação em dosagem mais elevada, ou então uma aplicação por via intravenosa na dosagem recomendada.

2—Retenção de leite e como auxiliar no tratamento de mastite por acúmulo de leite após o parto

Aplicar por via intramuscular e iniciar a ordenha 5 a 10 minutos após, de maneira lenta e gradual.

3—Prolapsos uterinos (casos recentes)

Aplicação epidural (vacas e éguas) associado a anestésico para obter a contração do útero antes de sua redução.

4—Retenção de placenta, hemorragia pós-parto, atonia do útero.

Aplicação intramuscular, intravenosa ou epidural em vacas e éguas. Nos casos de retenção tardia (7-8 dias) recomenda-se aplicação intravenosa.

5—Iminência de febre puerperal

POSOLOGIA:

| Espécie | Subcutânea ou intramuscular | Intravenosa | Epidural |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Vacas e éguas | 2 – 5 mL | 1 – 2,5 mL | 1,5 – 3 mL |
| Porcas | 1 – 3 mL | 0,5 – 1,5 mL | |
| Ovelhas e cabras | 0,5 – 1 mL | 0,25 – 0,75 mL | |

OBSERVAÇÕES:

A administração intravenosa deve ser lenta e o efeito se manifesta imediatamente e dura cerca de 10 minutos.

Na aplicação intramuscular ou subcutânea o efeito se manifesta 5 a 10 minutos após a aplicação. Este produto não apresenta efeito cumulativo, portanto pode se repetir a dosagem sem qualquer risco.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 20 frascos de 5 mL.

Embalagem plástica contendo 38 frascos de 100 mL.

Frasco-ampola contendo 20, 50 e 100 mL acondicionados em caixa individual

Manter a embalagem fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário



Licenciado pelo MAPA desde 11/09/78, Registrado sob o número SP 000217-8.000016

Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469

Proprietário e Fabricante:

Uzinas Químicas Brasileiras S/A

Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboicabal – SP

CEP: 14870-090

CNPJ: 50.380.674/0001-37

Indústria Brasileira