

OXCINT

— OCITOCINA —



Bovino

INJETÁVEL

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

Ocitocina sintética..... 12 UI

Veículo q.s.p..... 1 mL

INFORMAÇÕES GERAIS:

A síntese e a liberação da ocitocina pela hipófise posterior são desencadeadas por um reflexo neuroendócrino que envolve a estimulação tátil do úbere durante a amamentação, ou pelo contato manual durante a higienização do úbere e dos tetos antes da ordenha.

No caso da ordenha, a descida rápida e a retirada completa do leite dependem da liberação da ocitocina, responsável pelo estímulo e contração das células mioepiteliais que envolvem os alvéolos, e que promovem a liberação do leite para os ductos e cisternas da glândula mamária e consequente ejeção do leite.

A completa ejeção do leite durante cada ordenha é necessária para a manutenção do nível de produção e saúde do úbere.

INDICAÇÕES:

OXCINT é um hormônio sintético semelhante ao hormônio natural indicado para fêmeas bovinas, com atuação nas células mioepiteliais da glândula mamária favorecendo a ejeção e a remoção do leite residual.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

OXCINT pode ser administrado pelas vias intravenosa ou intramuscular, respeitando as normas básicas de assepsia.

A dose de OXCINT a ser administrada é de 0,3mL (3,6 UI). A aplicação deve ocorrer de 5 a 10 minutos (via intramuscular) ou de 2 a 5 minutos (via intravenosa) antes do início de cada ordenha. O tempo de atuação da ocitocina é rápido, podendo variar de 30 segundos até 4 minutos. A ocitocina não apresenta efeito cumulativo, portanto, a dosagem pode ser repetida sem qualquer risco ou de acordo com as orientações do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicar em fêmeas com hipersensibilidade conhecida a ocitocina.

Não aplicar em fêmeas com predisposição à ruptura uterina ou animais que apresentem enfermidades cardiovasculares.

O manejo inadequado dos animais pode resultar em estresse, o que diminui o efeito da ocitocina na ejeção do leite.

PRECAUÇÕES:

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Aplicar o produto somente em condições adequadas de assepsia.

Os resíduos de desinfetantes e detergentes normalmente empregados na lavagem de seringas e agulhas podem inativar a ocitocina e inibir sua ação.

Não diluir o produto antes da aplicação.

O uso da mesma agulha em diferentes animais pode aumentar o risco de transmissão de doenças.

Seguir as dosagens e as recomendações prescritas na bula do produto.

Não utilizar as embalagens vazias.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

OXCINT deve ser mantido em sua embalagem original e após o primeiro uso, deverá ser utilizado em um período máximo de até 12 dias. O restante do produto não utilizado deverá ser descartado após este período.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

O uso concomitante com vasoconstritores ou substâncias simpaticomiméticas pode resultar em hipertensão pós-parto.

A ocitocina pode potencializar a ação uterina das prostaglandinas.

APRESENTAÇÕES:

Cartucho contendo frasco-ampola de 5mL, 20mL, 50mL e 100mL

Embalagem plástica contendo 38 frascos-ampola de 100 mL.

PRAZO DE VALIDADE:

18 meses

ATENÇÃO OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sob o nº SP 000217-8.000004 em 27/11/2020.

Resp. Téc. Méd. Vet.:

Dra. Thaís Marino Silva Girio

CRMV/SP 17.469

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

UZINAS QUÍMICAS BRASILEIRAS S.A.

Praça Dr. Joaquim Batista, 150 - Jaboicabal - SP

CEP: 14870-090

Central de Relacionamento: 0800-1600024

CNPJ.: 50.380.674/0001-37 - Indústria Brasileira

Visite nosso site: www.ucbvet.com.br



ucbvet

saúde animal