

Placentina Forte

Ocitocina

USO VETERINÁRIO

Injetável



Bovinos

FÓRMULA:

Cada 1 mL contém: Ocitocina Sintética 14 UI, Veículo q.s.p 1 mL.

INFORMAÇÕES GERAIS:

A ocitocina é produzida no núcleo supra óptico do hipotálamo e armazenada no lóbulo posterior da hipófise (neurohipófise) no sistema nervoso central. É liberada na circulação sanguínea no momento do parto auxiliando na expulsão do feto e da placenta. Dentre outras funções, a ocitocina previne e controla a hemorragia uterina, além de favorecer a involução do útero após o parto.

INDICAÇÕES E ESPÉCIES:

A **PLACENTINA FORTE** é um hormônio sintético semelhante ao hormônio natural indicado para fêmeas bovinas, para induzir as contrações uterinas nos casos de hipotonia e inércia uterina primária ou secundária, involução uterina e retenção placentária.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A dose de **PLACENTINA FORTE** a ser administrada é de 5,0 mL (70,0 UI) por animal pela via subcutânea (SC). A ocitocina não apresenta efeito cumulativo, portanto, a dosagem pode ser repetida de acordo com as orientações do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não recomendado no caso de parto distócico.

Não aplicar em fêmeas com hipersensibilidade conhecida a ocitocina.

Não utilizar em fêmeas em gestação até o momento do parto.

Não aplicar em fêmeas com predisposição à ruptura uterina ou animais que apresentem enfermidades cardiovasculares.

PRECAUÇÕES:

Observe o aspecto do medicamento antes de usar.

Aplicar o produto somente em condições adequadas de assepsia.

Obedecer a dosagem e recomendações para o uso do produto.

Não utilizar as embalagens vazias.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

A **PLACENTINA FORTE** deve ser mantida em sua embalagem original e após aberta, deverá ser utilizada em período máximo de até 30 dias. O restante do produto não utilizado deverá ser descartado após este período.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

O uso concomitante com vasoconstritores ou substâncias simpatomiméticas pode resultar em hipertensão pós-parto.

A ocitocina pode potencializar a ação uterina das prostaglandinas.

APRESENTAÇÕES:

Cartucho contendo 1 frasco-ampola com 10 mL.

Caixa display contendo 30 frascos-ampola com 10 mL cada.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000217-8.000009 em 31/12/2021. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Giro - CRMV/SP 17.469. Proprietário e Fabricante: Uzinac Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 - Jaboticabal - SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira.