

SUPRATICK

— POUR ON

FÓRMULA: Cada 100 mL contém: Clorpirifós 7,00 g Fluzuron 2,50 g Veículo q.s.p. 100 mL **INFORMAÇÕES GERAIS:** O SUPRATICK é um carrapaticida, mosquicida e bemicida pour-on para bovinos que associa o fluzuron, uma benzoilfeniluréia pertencente aos IGRs (inibidores de crescimento de insetos e artrópodes) com o clorpirifós, um organofosforado que promove o efeito *knock down*. **INDICAÇÕES:** SUPRATICK é indicado para o tratamento das infestações causadas pelos principais ectoparasitas de bovinos: - Carrapato (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*); - Berne (*Dermatobia hominis*); - Mosca dos Chifres (*Haematobia irritans*); **POSOLOGIA E FORMA DE APLICAÇÃO:** SUPRATICK deve ser aplicado por via tópica pour-on, desde o pescoço até a cauda, em todo o dorso do animal (fio do lombo) de forma homogênea na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo, garantindo que o animal receba a dose de 7 mg/kg de clorpirifós e 2,5 mg/kg de fluzuron. Produto a ser aplicado em dose única. Esquema de dosificação do produto: Peso do animal 100 kg - Dose de Supratick 10 mL; Peso do animal 150 kg - Dose de Supratick 15 mL; Peso do animal 200 kg - Dose de Supratick 20 mL; Peso do animal 250 kg - Dose de Supratick 25 mL; Peso do animal 300 kg - Dose de Supratick 30 mL; Peso do animal 350 kg - Dose de Supratick 35 mL; Peso do animal 400 kg - Dose de Supratick 40 mL; Peso do animal 450 kg - Dose de Supratick 45 mL; Peso do animal 500 kg - Dose de Supratick 50 mL. Obs.: Animais com mais de 500 kg utilizar a posologia de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo. **CONTRAINDICAÇÕES/LIMITAÇÕES DE USO:** - Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. - Não utilizar em animais produtores de leite para o consumo humano. - Não utilizar este medicamento com prazo de validade vencido. - Não utilizar o produto nos animais nos horários mais quentes do dia. - Não utilizar o produto em dias de chuvas ou com probabilidade de chuva. - Não utilizar o produto em animais fracos, doentes ou com problemas hepáticos. - Não utilizar o produto fora das indicações do rótulo-bula. - Não aplicar o produto sobre pele ferida ou machucada. - Não aplicar o produto em regiões molhadas, sujas de fezes ou lama. - Produto de uso exclusivo para aplicação pour-on, não deve ser aplicado em hipótese nenhuma por via oral ou injetável, assim como, não utilizar em outras espécies de animais. **PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS:** - Realizar a pesagem dos animais. - Não foram conduzidos estudos de segurança em fêmeas prenhes e animais jovens com menos de seis meses de idade. - Tratar apenas animais saudáveis. - Obedecer a dosagem e via de administração recomendadas (pour-on). - Produto tóxico, manusear com cuidado. - Proteger pele e mucosas (olhos, boca e nariz), utilizando equipamentos de proteção individual (macacão, máscara, luvas e óculos) durante o manuseio e aplicação do produto. - Lavar bem as mãos após o manuseio do produto. - Não fumar, beber ou comer durante o manuseio e aplicação do produto. - Não lavar ou reutilizar a embalagem vazia. - Descartar as embalagens vazias e restos de produto, evitando a contaminação do meio ambiente. - Não contaminar coleções de água de qualquer natureza. - Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. - **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato do produto com a pele e mucosas, retirar as roupas contaminadas e lavar as áreas atingidas com água corrente e sabão. Em casos de intoxicação acidental, procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a embalagem do produto. - **TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA:** Fluzuron é uma benzoilfeniluréia e não possui antídoto específico, sendo o tratamento sintomático. Clorpirifós é um organofosforado, cujo antídoto é o Sulfato de Atropina e reativadores de colinesterase. **EFEITOS COLATERAIS:** - Em animais sensíveis ao produto, ocasionalmente pode ser observado balançar de cabeça e cauda, agitação, salvação e diminuição do apetite, porém esses sinais tendem a desaparecer 24 horas após a aplicação do produto. - Em caso de reação adversa procure o Médico Veterinário imediatamente. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** A toxicidade dos organofosforados pode ser potencializada quando administrados simultaneamente com carbamatos, outros organofosforados, bloqueadores neuromusculares (p. ex. anestésicos voláteis, íon magnésio e outros agentes) e fármacos que competem com os organofosforados por estereses-alvo (succinilcolina, fenotiazina e procaina), devido à possibilidade de sinergismo entre estes princípios ativos. Deve-se evitar também a associação com drogas que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados. Ainda, o uso simultâneo com morfina e teofilinas pode gerar hipotensão e fibrilação cardíaca. **PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** Após o primeiro uso, utilizar o produto em um período máximo de até 6 meses. Consulte sempre o Médico Veterinário. Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário. Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000217-8.000003 em 13/11/2020. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thais Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469 Proprietário: Usinas Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira Fabricante: A 3 VET Indústria, Comércio e Representações LTDA, Estrada Vicinal Vito Gaia Puoli, KM 3 + 200 metros, Zona Rural, Descalvado – SP CNPJ: 37.762.206/0001-69 **SAC 0800-1600024 ucbbvet.com**

PART.:

FABR.:

VENC.:

ATENÇÃO



CUIDADO VENENO



ucbbvet

saúde animal

IS12B329