

Tetralong

Cloridrato de oxitetraciclina

Injetável
USO VETERINÁRIO



Bovinos

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém: Oxitetraciclina base (cloridrato) 20 g, Veículo q.s.p. 100 mL.

INDICAÇÕES:

Antimicrobiano indicado para o tratamento de infecções causadas pelos seguintes microrganismos: *Anaplasma marginale* (Anaplasmose), *Pasteurella multocida*, *Leptospira pomona* e *Moraxella catarrhalis*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Bovinos: Aplicar 1 mL para cada 10 kg de peso corpóreo (equivalente a 20 mg/kg), por via intramuscular profunda. Não injetar mais que 10 mL em um mesmo local de aplicação.

OBSERVAÇÕES: Normalmente uma simples aplicação será suficiente para um tratamento eficaz. Entretanto, no caso da anaplasmose é prevista uma segunda dose 72 horas após a primeira. A posologia poderá ser modificada à critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO:

O produto não deve ser usado em vacas leiteiras lactantes.

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Guardar as embalagens fechadas em local seco e ao abrigo da luz solar, preferencialmente à temperatura entre 15°C e 30°C.
- Após aberto, utilizar todo o conteúdo do frasco em até 30 dias.

Tetralong pode se tornar escuro com o tempo, porém sua atividade permanece inalterada.

INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS:

O uso simultâneo com antiácidos contendo alumínio, cálcio ou magnésio e com preparações contendo ferro e sais de bismuto pode reduzir a absorção das Tetraciclina. Além disso, deve-se evitar a associação com drogas que potencializem o seu efeito nefrotóxico e/ou hepatotóxico, como os antibióticos aminoglicosídeos. Devido à capacidade das tetraciclina de se ligarem ao cálcio, podem ocorrer efeitos cardiovasculares (arritmias), além da deposição no tecido ósseo e

dentes devendo-se, portanto, evitar o uso desse medicamento em animais em fase de desenvolvimento.

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO, SOMENTE DEVE SER REALIZADO 22 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÃO:

Frasco-ampola contendo 50 mL.

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO



Licenciado pelo MAPA desde 18/03/1999, Registrado sob o nº SP 000217-8. 000007. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Giro – CRMV/SP 17.469. Proprietário: UZINAS QUÍMICAS BRASILEIRAS S.A. Praça Dr. Joaquim Batista, nº 150 Jaboticabal - SP - CEP.: 14870-090 - CNPJ: 50.380.674/0001-37 - Indústria Brasileira Fabricante: BIMEDA-BRASIL S.A Rod. Cônego Cyriaco Scaranello Pires nº 421 - Distrito Industrial - Monte Mor - São Paulo CEP 13190-000 - CNPJ: 00.328.741/0001-04 - Indústria Brasileira. SAC 0800 16 00024.

IS12B134a