



Meloxylrat

Meloxicam 3%



Anti-inflamatório Injetável

USO VETERINÁRIO

Equinos

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém: Meloxicam 3,0 g Veículo q.s.p. 100,00 mL

INFORMAÇÕES GERAIS:

O **MELOXYTRAT 3%** é um medicamento injetável da classe dos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) à base de meloxicam. Seu mecanismo de ação ocorre por meio da inibição da enzima ciclo-oxigenase (Cox), o que leva à interrupção da produção de prostaglandinas responsáveis pelas manifestações clínicas da inflamação. A ciclo-oxigenase (Cox) apresenta duas isoformas, a Cox-1, responsável pela produção de prostaglandinas citoprotetoras, e a Cox-2, responsável pela produção das prostaglandinas pró-inflamatórias. O **MELOXYTRAT 3%** age preferencialmente na Cox-2, permitindo que reduza a inflamação, dor e edema presentes nas afecções inflamatórias dos animais, conferindo ação anti-inflamatória, analgésica, antipirética e anti-exsudativa. A menor atividade na inibição da Cox-1 diminui a ocorrência de efeitos colaterais gastrointestinais, como úlceras gástricas, cólicas e sangramentos.

INDICAÇÕES:

O **MELOXYTRAT 3%** é indicado para o tratamento dos processos inflamatórios agudos e crônicos em equinos, principalmente no controle da febre, da dor e inflamação associados a cólicas e afecções musculoesqueléticas, tais como miosites, artrites, tendinites e osteoartrites. *A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.*

POSOLOGIA:

Equinos: Administrar pela via intravenosa 1 mL para cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 0,6 mg/kg) a cada 24 horas, durante 3 dias

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS COLATERAIS:

- Não utilizar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
- Não utilizar o produto fora das indicações da bula.
- Não utilizar o produto em outras espécies de animais.
- Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos, hipotensos ou em terapia diurética concomitante, devido ao risco de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Utilizar com cautela em animais com disfunções renais, hepáticas ou cardiovasculares, devendo o tratamento ser monitorado por um Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

- Administração exclusivamente injetável, respeitando as vias e dosagens indicadas para cada espécie animal.
- Realizar a pesagem dos animais antes do tratamento para definição da dose adequada.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não armazenar o medicamento junto a alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza.
- Lavar as mãos após a manipulação do produto.

REAÇÕES ADVERSAS:

Nos estudos clínicos conduzidos com o **MELOXYTRAT 3%**, não foram observadas reações locais ou sistêmicas. Portanto, não são esperadas reações adversas com o uso do produto, quando administrado conforme as instruções e indicações previstas nesta bula. Segundo a literatura, os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) podem causar alterações gastrointestinais. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção do tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

- Outros AINEs (anti-inflamatórios não-esteroidais) e corticosteróides devido ao aumento do risco de desenvolvimento de toxicidade gastrointestinal (ulcerações, sangramentos, diarreia, cólicas, etc.)
- Drogas nefrotóxicas (p.ex. aminoglicosídeos, anfotericina B, etc.), uma vez que podem aumentar o risco de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Anticoagulantes (p.ex. warfarina, heparina e ácido acetilsalicílico) pelo aumento da possibilidade de sangramentos.

APRESENTAÇÕES:

Frasco de vidro nos volumes: 10 mL, 50 mL e 100 mL

PRAZO DE VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

EQUINOS:

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após aberto, utilizar o produto em até 90 dias, se mantido na embalagem original e dentro das condições de armazenagem recomendadas.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO



Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 46/2023 em 22/11/2024.

Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Girio
CRMV/SP 17.469

Proprietário e Fabricante:

Uzinas Químicas Brasileiras S/A
Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboicabal – SP
CEP: 14870-090
CNPJ: 50.380.674/0001-37 – SAC 0800-16-000-24
Indústria Brasileira