

IVERMECTAN

PASTA EQUINO



Ivermectina

USO VETERINÁRIO

Equinos

FÓRMULA:

Cada seringa contém: Ivermectina 0,13 g, Veículo q.s.p. 6,50 g.

INDICAÇÕES:

Para o tratamento e controle dos principais parasitas dos equinos de lazer, esporte e trabalho: Vermínoses gastrintestinais e pulmonares, gasterofilose, habronemose, microfilariose, abaixo relacionados: **Vermes Gastrointestinais:** (adultos e larvas de 4º estágio) *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Triodontophorus spp*, *Cyathostomum spp*, *Cylicocycclus spp*, *Cylicostephanus spp*, *Cylicodontophorus spp*, *Gyalocephalus spp* **Vermes pulmonares:** *Dictyoaulos arnfieldi* **Outros vermes redondos:** (adultos e larvas de 4º estágio) *Oxyuris equi* (L3), *Parascaris equorum*, *Trichostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*, *Onchocerca spp* **Gastrófilos:** (estágio gástricos e orais) *Gasterophilus nasalis*, *Gasterophilus intestinalis* **Habronemoses:** (gástrica cutânea) *Habronema muscae*, *Habronema micróstoma*, *Draschia megastoma*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

- Administrar o produto por via oral, aplicando sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento.
- Após a aplicação manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos.
- A dose recomendada de Ivermectina para Equinos é de 200 µg por Kg de peso corporal. A seringa graduada permite dosificar com exatidão a quantidade de produto a ser administrada ao animal. Cada graduação equivale a 100 Kg de peso corporal, sendo uma seringa suficiente para dosificar um animal de 600 Kg de peso corpóreo.
- Não há contraindicações nem limitações de uso. O produto não apresenta efeitos biológicos indesejáveis, podendo ser administrado em éguas prenhes e garanhões em reprodução.

PRECAUÇÕES:

- Evitar fumar ou se alimentar durante a aplicação do produto;
- Lavar as mãos após o manuseio;
- Enterrar ou queimar as embalagens vazias ou com resto de produto após o uso;

- Produto tóxico para peixes e alguns organismos aquáticos;

APRESENTAÇÕES:

Cartucho individual com seringa de 6,5 g. Balde contendo 48 seringas de 6,5 g cada. Caixa contendo 24 seringas de 6,5 g cada. Caixa contendo 36 seringas com 6,5g cada.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 7.024/99 em 08/07/1999. Resp. Téc. Méd. Vet.: Dr. Thaís Marino Silva Girio – CRMV/SP 17.469 Proprietário e Fabricante: Uzinac Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira.

IS12B018b